

GRUPA AZOTY - Saletrzak 27 з бором

Селітра з доломітом та бором
N (Ca, Mg, B) 27(2, 4, 0.2)

GRUPA
AZOTY



- дві форми азоту (амонійна та нітратна) гарантують оптимальну доступність азоту протягом початкового циклу росту та розвитку рослин
- ідеальний для основного внесення, працює в період інтенсивного росту
- швидка розчинність добрива сприяє легкому засвоєнню азоту рослиною, а доломітове борошно пом'якшує шок від закислення іонами азоту
- дуже хороші розсіювальні властивості



ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

13,5%	азот в амонійній формі (NH ₄)
13,5%	азот в нітратній формі (NO ₃)
2%	кальцій (CaO), розчинний у воді
4%	магній (MgO)
0,2%	бор (B)



УПАКОВКА

біг-беги 500 кг

Доставляємо:



Вагонами



Автотранспортом



ТОВ "ВОЛПЕКС"
офіційний дистрибутор в
Україні

79021, м.Львів, вул.Петлюри 37А
sale@volpex.ua



ВЛАСТИВОСТІ

Saletrzak 27 з бором - гранульоване азотне добриво, аміачна селітра з домішками очищеного доломіту. Окислювальний шок аміачної селітри на незміцнілу кореневу систему озимих культур компенсується пом'якшувальною дією іонів кальцію та магнію, які входять до складу доломітового борошна як наповнювача гранули.

Saletrzak 27 з бором - універсальне азотне гранульоване добриво, призначене для застосування навесні під всі с/г культури з метою пришвидшення початку процесу вегетації. Завдяки оптимально підібраним складникам добриво призначене для підживлення озимого ріпаку, зернових озимих і ярих, картоплі, цукрового і кормового буряка, кукурудзи та зелених насаджень.

Saletrzak 27 з бором може застосовуватися для всіх типів ґрунтів, однак, найкраще підходить для кислих та бідних на магній ґрунтів. Це добриво можна застосовувати під всі с/г культури як перед посівом, так і для основного внесення. Використання на основних або вапнованих ґрунтах вимагає боронування або розпушування міжрядь.



РЕКОМЕНДАЦІЇ ЗАСТОСУВАННЯ

Культури	В залежності від вмісту азоту в ґрунті		
	низький	середній	високий
Ріпак на кожну 1 т. насіння	150	182	220
Кукурудза на зерно - на кожну 1 т. насіння	60	74	85
Горох, квасоля - на кожну 1 т. насіння	37	50	67
Картопля - на кожні 10 т. бульб	150	167	185
Цукровий буряк	150	165	185
Луки і пасовища - на кожні 2 т сіна або 10 т зеленої маси	67	78	90
Буряк, цибуля, часник, рання капуста, рання морква, петрушка кг / га	370	440	520

При виникненні проблем з оцінкою необхідності внесення азотних добрив, рекомендуються дози, що високі, як для потреб середнього дозування.