

INTERMAG - СОЯ / БОБОВИ

Мікродобриво для сої та бобових культур

- склад добрива і пропорції мікроелементів повністю відповідають вимогам сої до листового підживлення
- стимулює процеси формування і росту насіння
- зміцнює фізичний стан рослин і підвищує ефективність споживання елементів живлення з ґрунту
- зменшує стрес від засобів захисту рослин



ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН

15,0%	Азот (N) ^{180 г/л}
2,0%	Магній (MgO) ^{24 г/л}
1,6%	Сірка (SO ₃) ^{19,2 г/л}
0,5%	Бор (B) ^{6,0 г/л}
0,3%	Цинк (Zn) ^{3,6 г/л}
0,2%	Мідь (Cu) ^{2,4 г/л}
0,4%	Марганець (Mn) ^{4,8 г/л}
0,3%	Залізо (Fe) ^{3,6 г/л}
0,02%	Титан (Ti) ^{0,24 г/л}
0,006%	Молібден (Mo) ^{0,07 г/л}
0,02%	Кобальт (Co) ^{0,24 г/л}



ВЛАСТИВОСТІ

INTERMAG - СОЯ / БОБОВИ - рідке багатокомпонентне мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення сої, польових бобів, гороху, конюшини та люцерни; швидко та ефективно забезпечує рослини мікроелементами в пропорціях, що відповідають потребам росту та плодоношення. Хелатна EDTA-форма цинку (Zn), міді (Cu), марганцю (Mn) та заліза (Fe) робить повністю доступними для рослин ці мікроелементи. Препарат також містить магній (Mg) та азот (N), що покращує процеси ферментації, а також поглинання та засвоєння рослинами поживних речовин з ґрунту.

У мікродобриві **INTERMAG - СОЯ / БОБОВИ** використовується технологія INT, яка була розроблена з метою підвищення ефективності дії добрив та біостимуляторів. INT збільшує швидкість та ефективність поглинання, транспортування і використання поживних речовин в рослині завдяки індивідуально підібраним компонентам органічного походження. INT забезпечує мінімальні втрати врожаю в умовах стресу, знижує ризик змивання дощем застосованих агрохімікатів.

INTERMAG - СОЯ / БОБОВИ містить кобальт (Co), необхідний для зв'язування молекулярного азоту бульбочковими бактеріями та різними мікроорганізмами, є компонентом вітаміну B₁₂, бере участь в окислювальних процесах, активує ряд ферментів. Також препарат містить титан (Ti) - комплексон і активатор росту рослин, який суттєво покращує і пришвидшує обмінні процеси в рослинах.



ДОЗУВАННЯ

INTERMAG - СОЯ / БОБОВИ слід застосовувати у вигляді водного розчину. Його можна використовувати разом з іншими препаратами після проведення тесту, що підтверджує можливість змішування.

Оптимальна кількість робочого розчину: 200-300 л/га. Рекомендований розхід добрива при одному позакореновому підживленні - 2-3 л/га.

Рекомендована кількість позакоренових підживлень на протязі вегетаційного періоду - 2 підживлення:

- перше - період 6-7 листків;
- друге - у фазі бутонізації (для збільшення вмісту білка).

INTERMAG



УПАКОВКА

баки 1000л, каністри 20л, каністри 5л

Доставляємо:



Автотранспортом



Службами доставки



ТОВ "ВОЛПЕКС"

офіційний дистрибутор в Україні

79021, м.Львів, вул.Петлюри 37А
sale@volpex.ua

тел.: (032) 245-5575
моб.: (068) 245-5575