ВОЛПЕКС®



БУРЯК

Мікродобриво для буряків

Мікродобриво для буряків

склад добрива повністю відповідає потребам підживлення буряка (містить натрій і бор)

підвищує стійкість до засухи, до хвороб, зміцнює фізичний стан рослин

підвищує вміст цукрів

позитивно впливає на коефіцієнт алкалоїдності соку

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

15,0%	Азот (N) 194 г/л
2,0%	Магній (MgO) 26 г/л
1,8%	Сірка (SO_3) 24 г/л
0,5%	Бор (B) 6,5 г/л
0,2%	Мідь (Cu) 2,6 г/л
0,2%	Залізо (Fe) 2,6 г/л
0,65%	Марганець (Mn) 8,5 г/л
0,005%	Молібден (Mo) 0,065 г/л
0,5%	Цинк (Zn) 6,5 г/л
0,02%	Титан (Ti) 0,26 г/л
3,0%	Натрій (Na_2O) 39 г/л

ОПИС ПРОДУКТУ

INTERMAG - **БУРЯК** – рідке багатокомпонентне мікродобриво, призначене для позакореневого підживлення буряків, швидко і ефективно постачає рослинам мікроелементи в оптимальних пропорціях, з особливим акцентом на борі (B), натрію (Na) і марганці (Mn), до недостатності яких буряк дуже чутливий.

Мікроелементи у препараті **INTERMAG** - **БУРЯК** грамотно збалансовані і знаходяться в хелатній формі (Cu, Fe, Mn, Zn скомплексовані EDTA), що робить їх повністю доступними для рослин. Мікродобриво також містить магній (Mg) і азот (N) для активізації процесів ферментації, поліпшення засвоєння поживних речовин.

INTERMAG - **БУРЯК** містить титан (Ti) – комплексон і активатор росту і розвитку рослин, який дозволяє якісно покращити вбирання кореневою системою азоту, калію, фосфору та інших поживних складників з ґрунтового розчину.

INT TECHNOLOGY

У мікродобриві **INTERMAG** - **БУРЯК** використовується технологія INT, яка була розроблена з метою підвищення ефективності дії добрив та біостимуляторів. INT збільшує швидкість та ефективність поглинання, транспортування і використання поживних речовин в рослині завдяки індивідуально підібраним компонентам органічного походження. INT забезпечує мінімальні втрати врожаю в умовах стресу, знижує ризик змивання дощем застосованих агрохімікатів.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендований розхід мікродобрива **INTERMAG** - **БУРЯК** при одному позакореневому підживленні – 2-3 л/га.
Середній розхід робочого розчину – 300 л/га.
Рекомендована кількість позакореневих підживлень на протязі вегетаційного періоду – 3 підживлення.