ВОЛПЕКС®



ОЛІЙНІ / СОНЯШНИК

Мікродобриво для олійних культур

Мікродобриво для олійних культур

склад мікродобрива відповідає потребам у підживленні олійних культур

підвищує стійкість рослин до стресів

Cu, Fe, Mn, Zn – схелатовані EDTA

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

15,0%	Азот (N) 186 г/л
2,5%	Магній (MgO) 31 г/л
0,5%	Бор (B) 6,2 г/л
0,1%	Мідь (Cu) 1,2 г/л
0,5%	Залізо (Fe) 6,2 г/л
0,5%	Марганець (Mn) 6,2 г/л
0,005%	Молібден (Mo) 0,06 г/л
0,5%	Цинк (Zn) 6,2 г/л
0,03%	Титан (Ti) 0,37 г/л
2,5%	Сірка (SO_3) 31 г/л

ОПИС ПРОДУКТУ

INTERMAG - **ОЛІЙНІ / СОНЯШНИК** - рідке концентроване багатокомпонентне добриво для листкового підживлення, яке постачає рослинам мікроелементи у пропорціях, що відповідають вимогам живлення олійних культур (ріпак, соняшник, льон), а також магній та азот, які покращують поглинання та засвоєння поживних речовин.

INTERMAG - **ОЛІЙНІ / СОНЯШНИК**
- відповідає вимогам до позакореневого підживлення олійних культур;
- є висококонцентрованим комплексним добривом;
- підвищує стійкість рослин до засух і морозів;
- зміцнює фізичний стан рослин і підвищує стійкість до хвороб;
- дозволяє отримати значне підвищення якісно-кількісних показників врожаю;
- стабільне в робочих розчинах, не забиває форсунки оприскувачів;
- містить мікроелементи в хелатній, легкодоступній для рослин формі;
- містить титан (Ti) – комплексон і активатор росту рослин, який дозволяє якісно покращити вбирання кореневою системою азоту, калію, фосфору та інших складових з ґрунтового розчину.

У мікродобриві **INTERMAG** - **ОЛІЙНІ / СОНЯШНИК** використовується технологія INT, яка була розроблена з метою підвищення ефективності дії добрив та біостимуляторів. INT збільшує швидкість та ефективність поглинання, транспортування і використання поживних речовин в рослині завдяки індивідуально підібраним компонентам органічного походження. INT забезпечує мінімальні втрати врожаю в умовах стресу, знижує ризик змивання дощем застосованих агрохімікатів.

ДОЗУВАННЯ

Культури	Рекомендовані норми внесення	
	Рекомедований термін виконання підживлення	Норма внесення (л/га)
Ріпак озимий	Осінь: формування розетки (фаза 4-8 листків).	3
Ріпак озимий	Весна: I – після початку вегетації (початок росту бічних пагонів – видно 6 міжвузлів); II – формування бутонів квіток (бутонізація) – початок цвітіння; III – кінець цвітіння – формування лусок.	2
Ріпак ярий, гірчиця	I – ріст листя та бічних пагонів – видно 6 міжвузлів; II – формування бутонів квіток (бутонізація) – початок цвітіння; III – кінець цвітіння – формування лусок.	2
Соняшник	I – ріст листя; II – видно 7 міжвузлів – суцвіття відділяється від молодих листків.	2
Льон	I ріст листків на головному пагоні; II – ріст головного пагону.	2