



ВОЛПЕКС®



Магнієва селітра

NO₃ - 10.5%, MgO - 15.5%

Магній азотнокислий

не містить небажаних домішок і нерозчинного осаду
сумісний з іншими добривами


сипуча дрібна гранула, зручна у використанні
краще джерело магнію на гідропонії

на відміну від сульфату магнію може використовуватися
спільно з кальцієвою селітрою

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

10,5% Азот (N-NO₃)

15,5% Магній (MgO)



ОПИС ПРОДУКТУ

ALVENTA - Магнієва селітра - високоефективне азотно-магнієве добриво, призначене в основному для використання на закритих ґрунтах для овочевих та плодово-ягідних культур, в технологіях гідропоніки. Також може застосовуватися на відкритому ґрунті як складник робочої суміші при позакореновому підживленні рослин, які відчувають дефіцит магнію.

Найбільшу кількість магнію виносять цукровий та кормовий буряк, тютюн, зернові бобові (в т.ч. горох), бобові трави, овочеві культури (огірок, картопля, томат, капуста). Чутливі до нестачі магнію конопля, просо, кукурудза.

Магній, дефіцит якого особливо часто спостерігається на легких ґрунтах, впливає на всі процеси в клітинах рослин, де відбувається передача хімічної енергії та її накопичення (фотосинтез, дихання, гліколіз). Разом з кальцієм магній бере участь в побудові пектинових речовин клітинних стінок, через те у випадку гідропоніки часто змішується з кальцієвою селітрою у пропорції 1:2 або 1:3. Магнієм, завдяки його здатності зв'язування в комплекси, активуються більш ніж 300 ферментів у рослинах. Також магній має безпосередній вплив на транспортування і засвоєння фосфору.

ALVENTA - Магнієва селітра ефективно усуває нестачу магнію протягом всього періоду вегетації, а також постачає рослині найбільш легко- і швидкозасвоювану форму азоту - нітратну, яка буває особливо необхідна навесні або у післястресовий період. Це дозволяє зменшити обсяг застосування азотних добрив - аміачної селітри або карбаміду. **ALVENTA - Магнієва селітра** дозволяє швидко підняти рівень магнію у рослинах, тоді як магній, зв'язаних в інших хімічних формах, довго вивільняється в процесі метаболізму рослин і не завжди доступний в найбільш критичних фазах росту.

ДОЗУВАННЯ

Дозування залежить від технології крапельного поливу або гідропоніки, етапу вегетації або плодоношення і регулюється в залежності від часу доби та/або вмісту магнію та азоту в інших складниках робочого розчину. При самостійному застосуванні концентрація не повинна перевищувати 3-5% (3-5 г/л води).

При передозуванні є ризик відкладення нітратних форм, тому необхідно зменшити концентрацію у 2-3 рази на протязі 3-5 днів, надалі повернутися до розрахованої програми внесення.