



ВОЛПЕКС®



Saletrzak® 27 з бором

N (Ca, Mg, B) 27(2, 4, 0.2)

Селітра з доломітом та бором

дві форми азоту (амонійна та нітратна) гарантують оптимальну доступність азоту протягом початкового циклу росту та розвитку рослин

ідеальний для основного внесення, працює в період інтенсивного росту

швидка розчинність добрива сприяє легкому засвоєнню азоту рослиною, а доломітове борошно пом'якшує шок від закислення іонами азоту

дуже хороші розсіювальні властивості

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

13,5%	азот в амонійній формі (NH ₄)
13,5%	азот в нітратній формі (NO ₃)
2%	кальцій (CaO), розчинний у воді
4%	магній (MgO)
0,2%	бор (B)

ОПИС ПРОДУКТУ

Saletrzak® 27 з бором - гранульоване азотне добриво, аміачна селітра з домішками очищеного доломіту. Окислювальний шок аміачної селітри на незміцнілу кореневу систему озимих культур компенсується пом'якшувальною дією іонів кальцію та магнію, які входять до складу доломітового борошна як наповнювача гранули.

Saletrzak® 27 з бором - універсальне азотне гранульоване добриво, призначене для застосування навесні під всі с/г культури з метою пришвидшення початку процесу вегетації. Завдяки оптимально підібраним складникам добриво призначене для підживлення озимого ріпаку, зернових озимих і ярих, картоплі, цукрового і кормового буряка, кукурудзи та зелених насаджень.

Saletrzak® 27 з бором може застосовуватися для всіх типів ґрунтів, однак, найкраще підходить для кислих та бідних на магній ґрунтів. Це добриво можна застосовувати під всі с/г культури як перед посівом, так і для основного внесення. Використання на основних або вапнованих ґрунтах вимагає боронування або розпушування міжрядь.

ДОЗУВАННЯ

Культури	В залежності від вмісту азоту в ґрунті		
	низький	середній	високий
Ріпак на кожну 1 т. насіння	150	182	220
Кукурудза на зерно - на кожну 1 т. насіння	60	74	85
Горох, квасоля - на кожну 1 т. насіння	37	50	67
Картопля - на кожні 10 т. бульб	150	167	185
Цукровий буряк	150	165	185
Луки і пасовища - на кожні 2 т сіна або 10 т зеленої маси	67	78	90
Буряк, цибуля, часник, рання капуста, рання морква, петрушка кг / га	370	440	520

При виникненні проблем з оцінкою необхідності внесення азотних добрив, рекомендуються дози, що високі, як для потреб середнього дозування.