



**VOLPEKS®**



## **amofoska® CORN 4-10-22**

**NPK (CaMgS) 4-10-22 (5-2.5-10) + B, Zn**

Комплексне передпосівне добриво

для всіх культур - зернових, ріпаку, картоплі, цукрових буряків тощо

не містить шкідливих рівнів важких металів, таких як миш'як, кадмій, свинець або ртуть, тому є безпечним для навколишнього середовища

особливо підходить для використання на ґрунті з низьким вмістом калію і бору

### **ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:**

<b>4%</b>	азот в амонійній формі (NH <sub>4</sub> )
<b>10%</b>	фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), розчинний у мінеральних кислотах
<b>22%</b>	калій (K <sub>2</sub> O), розчинний у воді
<b>5%</b>	кальцій (CaO), розчинний у воді
<b>2,5%</b>	магнію (MgO)
<b>10%</b>	сірка в сульфатній формі (SO <sub>3</sub> )
<b>0,1%</b>	бору (B)
<b>0,2%</b>	цинк (Zn)

### **ОПИС ПРОДУКТУ**




**Amofoska® CORN 4-10-22** є типовим передпосівним добривом, яке потрібно змішувати з ґрунтом. Посів насіння можна проводити через 3-5 днів після внесення добрива. Воно придатне для всіх типів ґрунтів, незалежно від їх компактності та ступеня кислотності.

**Мікроелементи (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn)**, отримані з природних фосфатних порід, є цінними елементами для поліпшення біодоступності інших інгредієнтів. У звичайних умовах Amofoska® 4-16-18 не містить шкідливих важких металів, таких як миш'як, кадмій, свинець або ртуть, тому є безпечним для навколишнього середовища.

Висока якість гранул, тобто рівномірний розмір зерна, рівномірний склад кожної гранули і відсутність пилу полегшує навіть посів. Сірка у легкозасвоюваній формі є цінною речовиною для сірковмісних рослин, особливо рекомендована для використання на ґрунтах з низьким вмістом сірки.

Основним компонентом цього добрива є калій і дози повинні бути визначені відповідно до попиту підживлення рослин на калій і відповідно до вмісту калію в ґрунті. Частка фосфору в калію забезпечує достатнє підживлення фосфором всіх рослин, якщо використовується правильна доза калію. Однак у більшості випадків необхідне додаткове підживлення азотом.



### **ДОЗУВАННЯ**

<b>Культури</b>	<b>Дози (кг/га)</b>
Кукурудза для зерна і силосу	200 - 450
Озимий ріпак	100 - 300
Весняне підживлення	100 - 300
Кормова капуста	100 - 200
Озимі і ярі культури	200 - 450
Цукровий буряк	200 - 450
Рання картопля	100 - 200
Конюшина з травами	100 - 250

Дози, наведені в таблиці, є індикативними і повинні коригуватися в залежності від очікуваного врожаю. Це добриво можна застосовувати раною весною на пасовищах в дозі менше 400 кг добрива на гектар. На початку весни, а також після випасу пасовищ, необхідно застосувати додаткові 60 кг/га.