



ВОЛПЕКС®



amofoska® 5-10-25 з бором

NPK (CaS) 5-10-25 (5-14) + B 0.1%

Комплексне передпосівне добриво

характеризується високим вмістом калію, сірки та бору
забезпечує високу врожайність відповідної якості
калій підвищує зимостійкість плантацій ріпаку

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

5%	азот в амонійній формі (NH ₄)
10%	фосфор (P ₂ O ₅), розчинний у мінеральних кислотах
25%	калій (K ₂ O), розчинний у воді
5%	кальцій (CaO), розчинний у воді
14%	сірка в сульфатній формі (SO ₃)
0,10%	бору (B)

ОПИС ПРОДУКТУ

Amofoska® 5-10-25 з бором - це добриво, призначене для інтенсивного вирощування озимого та весняного ріпаку, гірчиці, капустяних культур, бобових культур.

Характеризується високим вмістом калію, сірки та бору. При правильно обраному співвідношенні забезпечує високий вихід відповідної якості культур. Сірка в добриві, у формі, яка легко доступна рослинам, стимулює поглинання та правильне використання азоту, калій підвищує зимостійкість олійного ріпаку, а додавання бору - мікроелементів, що відповідають за поділ клітин - забезпечує належне цвітіння і зв'язування стручків. Це добриво можна також використовувати для овочів, які потребують хорошого запасу калію і сірки: капусти, моркви, селери, шпинату, огірків і салату.

Висока якість гранул, тобто рівномірний розмір зерна, рівномірний склад кожної гранули і відсутність пилу полегшує навіть посів. Сірка у легкозасвоюваній формі є цінною речовиною для сірковмісних рослин, особливо рекомендована для використання на ґрунтах з низьким вмістом сірки.

Мікроелементи (Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), отримані з природних фосфатних порід, є цінним допоміжним добривом, що поліпшує біодоступність інших інгредієнтів.

ДОЗУВАННЯ

Культури	Дози (кг/га)
Озимий ріпак	250 - 450
Весняне підживлення	200 - 350
Бурак	200 - 650
Ранні сорти картоплі (на гною)	200 - 350
Пізні сорти картоплі (на гною)	250 - 450
Бобові культури для насіння	200 - 400
Конюшина і люцерна в чистому посіві (зелений корм)	250 - 400
Гірчиця (біла, чорна, коричнева)	200 - 300
Пасовище	150 - 300

Азот у добриві є достатнім лише для першого періоду росту рослин, тоді цей компонент необхідно доповнити використанням азотних добрив (переважно сечовини або аміачної селітри) відповідно до потреб культивованих культур. При підживленні луків і пасовищ одноразові дози добрив не повинні перевищувати 300 кг / га, а більш високі дози добрив слід розділити на дві частини. Бор, що міститься в добриві, сприяє збільшенню присутності бобових у мелі. При вирощуванні цукрових буряків або картоплі без розсіювання гною, наведені дози добрив рекомендується збільшити на 100 кг/га.