



ВОЛПЕКС®



amofoska® 4-16-18

NPK (CaS) 4-16-18 (5-10)

Комплексне передпосівне добриво

універсальне комплексне добриво для всіх типів с/г-культур добриво з сіркою, що містить частково розчинений фосфат, має нейтральну реакцію, тому не підкислює ґрунт не містить важких металів (миш'яку, кадмію, свинцю, ртуті), тому є безпечним для навколишнього середовища

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

4%	азот в амонійній формі (NH ₄)
16%	фосфор (P ₂ O ₅), розчинний в мінеральних кислотах
18%	калій (K ₂ O), розчинний у воді
5%	кальцій (CaO), розчинний у воді
10%	сірка в сульфатній формі (SO ₃)

ОПИС ПРОДУКТУ




Amofoska® 4-16-18 є типовим універсальним передпосівним добривом для всіх типів с/г-культур, але в першу чергу - для озимих зернових і ріпаку. Навесні **Amofoska® 4-16-18** особливо корисна для підживлення картоплі та цукрових буряків завдяки правильному співвідношенню пропорцій фосфору до калію для коренеплідів. Співвідношення NPK 4-16-18 є оптимальним для бобових культур, які потребують початкової дози азоту та співмірних доз легкозасвоюваного фосфору з калієм.

Мікроелементи (B, Co, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn), отримані з природних фосфатних порід, важливі для поліпшення біодоступності макро- та мезоелементів. **Amofoska® 4-16-18** не містить шкідливих важких металів, таких як миш'як, кадмій, свинець або ртуть, тому є безпечним для навколишнього середовища.

Висока якість гранул, рівномірний розмір і склад кожної гранули, відсутність пилу при пересипанні полегшує технологію застосування. Сірка у легкозасвоюваній формі цінна для сірколюбних рослин, через це добриво особливо рекомендується для використання на ґрунтах з низьким вмістом сірки.

Оскільки основним компонентом цього добрива є калій, дози внесення повинні бути визначені відповідно до передбачуваного вносу калію конкретною культурою з урахуванням вмісту калію в ґрунті. Частка фосфору у добриві забезпечує достатнє підживлення фосфором всіх культур, якщо використовується правильна доза калію. Однак, у більшості випадківв необхідне додаткове підживлення азотом.



ДОЗУВАННЯ

Культури	Дози (кг/га)
Озимі культури	300 - 500
Весняні культури	250 - 400
Озимий ріпак	500 - 700
Цукровий буряк	700 - 900
Картопля	600 - 800
Бобові (боби, горох, люпин)	400 - 600
Конюшина і люцерна з травами (зелений корм)	500 - 700

Наведені дози приблизні і повинні бути змінені відповідно до розміру очікуваного врожаю та результатів аналізу ґрунту. Рекомендується внесення методом перемішування з ґрунтом на глибину 10-15 см. **Amofoska® 4-16-18** можна використовувати ранньою весною для пасовищ у дозі, що не перевищує 400 кг добрива на гектар. Ранньою весною і до наступного випасу додатково застосовувати 60 кг/га.