ВОЛПЕКС®



КАПУСТЯНІ

Мікродобриво для капустяних культур

Мікродобриво для капустяних культур

містить збалансований набір макро- та мікроелементів, призначений для задоволення потреб капустяних культур

суттєво підвищує споживчі і смакові показники

Zn, Cu, Mn, Fe схелатовані EDTA

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

5,2%	Азот (N) 58,0 г/л
3,1%	Калій (K_2O) 35,0 г/л
0,6%	Магній (MgO) 6,7 г/л
1,5%	Сірка (SO_3) 16,7 г/л
0,03%	Бор (B) 0,3 г/л
0,01%	Мідь (Cu) 0,1 г/л
0,025%	Залізо (Fe) 0,3 г/л
0,05%	Марганець (Mn) 0,6 г/л
0,005%	Молібден (Mo) 0,056 г/л
0,02%	Цинк (Zn) 0,2 г/л
0,05%	Титан (Ti) 0,6 г/л

ОПИС ПРОДУКТУ

INTERMAG - **КАПУСТЯНІ** - легкозасвоюване добриво, призначене для виконання листкового та кореневого підживлення всіх видів капустяних - білокачанної, червонокачанної, пекінської, брюссельської, листової капусти, кольрабі, брокколі. Препарат містить збалансований набір макро- та мікроелементів, що дозволяє якісно підвищити споживчі і смакові показники цієї важливої сільськогосподарської культури.

INT TECHNOLOGY

У мікродобриві **INTERMAG** - **КАПУСТЯНІ** використовується технологія INT, яка була розроблена з метою підвищення ефективності дії добрив та біостимуляторів. INT збільшує швидкість та ефективність поглинання, транспортування і використання поживних речовин в рослині завдяки індивідуально підібраним компонентам органічного походження. INT забезпечує мінімальні втрати врожаю в умовах стресу, знижує ризик змивання дощем застосованих агрохімікатів.

INTERMAG - **КАПУСТЯНІ** містить титан (Ti) - комплексон і активатор росту рослин, який суттєво покращує і пришвидшує обмінні процеси в рослинах, сприяє підвищенню якості та інтенсивності засвоєння поживних речовин з ґрунту.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендовані витрати **INTERMAG** - **КАПУСТЯНІ** при одній обробці - 3-8 л/га.
Рекомендована кількість позакореневих підживлень - 2-3 внесення.

РОЗСАДА: поливати 0.2-0.3% розчином мікродобрива, витрата робочого розчину - 5-10 л на 10 м2.
В ҐРУНТІ: (після висадки): почати підживлення можна через 2-3 тижні після висадки розсади в ґрунт. Протягом вегетаційного періоду виконати 3-5 операцій по позакореневому підживленню з інтервалом в 14 днів, витрачаючи 3-8 л/га.