



ВОЛПЕКС®



ЦИБУЛЕВІ

Мікродобрива для цибулевих культур

Мікродобрива для цибулевих культур

вдало збалансований набір макро- і мікроелементів, які забезпечують потреби цибулевих протягом всього періоду вегетації

підвищує споживчі і смакові показники

стабільне в робочих розчинах (не забиває форсунки обприскувачів)

Zn, Cu, Mn, Fe схелатовані EDTA

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

3,5%	Азот (N) ^{40 г/л}
4,6%	Калій (K ₂ O) ^{51,5 г/л}
0,6%	Магній (MgO) ^{6,7 г/л}
1,5%	Сірка (SO ₃) ^{16,8 г/л}
0,02%	Бор (B) ^{0,2 г/л}
0,02%	Мідь (Cu) ^{0,2 г/л}
0,02%	Залізо (Fe) ^{0,2 г/л}
0,04%	Марганець (Mn) ^{0,4 г/л}
0,001%	Молібден (Mo) ^{0,011 г/л}
0,02%	Цинк (Zn) ^{0,2 г/л}
0,03%	Титан (Ti) ^{0,3 г/л}

ОПИС ПРОДУКТУ

INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ - комплексне мікродобриво, яке призначене для підживлення всіх видів цибулевих – цибулі, цибулі-ріпчастої, часнику. Препарат містить збалансований набір макро- і мікроелементів, що дозволяє якісно підвищити споживчі й смакові показники цибулевих.



У мікродобриві **INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ** використовується технологія INT, яка була розроблена з метою підвищення ефективності дії добрив та біостимуляторів. INT збільшує швидкість та ефективність поглинання, транспортування і використання поживних речовин в рослині завдяки індивідуально підібраним компонентам органічного походження. INT забезпечує мінімальні втрати врожаю в умовах стресу, знижує ризик змивання дощем застосованих агрохімікатів.

INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ містить титан (Ti) - комплексон і активатор росту рослин, який суттєво покращує і пришвидшує обмінні процеси в рослинах, сприяє підвищенню якості та інтенсивності засвоєння поживних речовин з ґрунту.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендується протягом вегетаційного періоду виконати 2-3 операції по позакореневому підживленню препаратом **INTERMAG - ЦИБУЛЕВІ** з інтервалом в 10-14 днів, витрачаючи щораз 2-4 л добрива на 1 гектар (норму добрива підібрати залежно від потенціалу й складу ґрунту, а також фази розвитку й стану рослин).

Рекомендована концентрація робочого розчину 1-2% (1-2 л добрива на 100 л води), оптимальна витрата робочої рідини – 300-400 л/га. Перше позакореневе підживлення цибулевих можна проводити в період 3-4 справжніх листків, наступні – з інтервалом в 10-14 днів після першого.