ВОЛПЕКС®



FERTIPLON NK

NO_3 - 13.7%, K_2O - 46%

Калійна селітра

кристалічна форма, повністю розчинна у воді

ультрачисте добриво з низьким вмістом хлоридів

легкозасвоюваний продукт, сумісний з усіма типами добрив

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

13,7%	Азот ($N\text{-}NO_3$)
46,0%	Калій (K_2O)

ОПИС ПРОДУКТУ

GRUPA AZOTY - **Fertiplon NK** - кристалічна калійна селітра (безводний нітрат калію) - спеціалізоване універсальне азотно-калійне добриво, призначене для застосування на тепличних культурах та цінних ґрунтових рослинах. Добриво може застосовуватись як сировина для виробництва багатокомпонентних мінеральних добрив, мікродобрив, а також в якості ефективного швидкодіючого складника в робочому розчині для позакореневого внесення мікродобрив та ЗЗР.

GRUPA AZOTY - **Fertiplon NK** є ідеальним джерелом азоту і калію для підживлення промислових та городніх с/г-культур на всіх етапах вегетації, рекомендується в якості основного складника живлення при вирощуванні овочів, фруктів та декоративних рослин на ґрунтах з середнім та високим рівнем забезпеченості фосфором. Калійна селітра застосовується у всіх системах фертигації, гідропоніки, а також на відкритих ґрунтах, і складається тільки з макроелементів які легко, швидко і повністю засвоюються рослинами.

ДОЗУВАННЯ

GRUPA AZOTY - **Fertiplon NK** рекомендується для застосування в період цвітіння та утворення плодів на овочевих культурах, винограді, льону, тютюну, цитрусових та плодово-ягідних культурах, які чутливі до шкідливої дії хлору.

Загальні рекомендації з застосування калійної селітри:
- для позакореневого підживлення озимої пшениці в фазі колосіння (доза 3-6 кг/га на об’єм робочого розчину 200-250 л води на гектар), що забезпечує гідрофільність клітин цитоплазми зерен при посушливій погоді;
- для прикореневого підживленні картоплі та інших овочевих культур в другій половині вегетації (доза 50-100 кг/га), а також позакоренево (2-5 кг/га, 1.5-2% водний розчин)
- для тепличних рослин до 0.5 % концентрації (50 г на 10 л води), для рослин на відкритому ґрунті – 0.5-1.0% концентрації (50-100 г на 10 л води).