



ВОЛПЕКС®



МОНО Цинк

Zn - 8.4%

Органічний цинк у водному розчині

швидкозасвоюваний цинк на органічних компонентах
стійкий у робочих розчинах, не забиває форсунки оприскувачів
оптимальне рішення з точки зору "ціна/якість" для промислових
с/г культур

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

8,4%

Цинк (Zn) ^{112 г/л}

ОПИС ПРОДУКТУ

Цинк бере участь у метаболізмі рослин та в багатьох ферментативних процесах, а також впливає на поглинання і засвоєння фосфору. Рослини реагують на брак цинку карликовістю форми і хлорозом листків (розетки малих жорстких листків плодових дерев), а у кукурудзи - широкими білими смугами на обох сторонах нерва листка. Дефіцит цинку знижує поглинання амонійного азоту, зменшує накопичення цукрів, збільшується кількість органічних кислот, порушується синтез білка, зростає вміст небілкових форм азоту - амідів і нітратів.

INTERMAG - МОНО Цинк - рідке мікродобриво, концентрат цинку на базі органічних комплексоутворюючих агентів, які забезпечують повне і швидке поглинання цинку поверхню листків та стабільність у робочих розчинах для позакореневого підживлення.

Препарат рекомендується в першу чергу для позакореневого підживлення кукурудзи, сої, соняшнику, зернових, бобових культур, плодових дерев, а також льону, хмелю, винограду і картоплі. Застосування **INTERMAG - МОНО Цинк** в програмах інтенсивного підживлення на великих площах с/г-культур веде до збільшення врожаю, а також значно покращує його якісні характеристики.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендована витрата **INTERMAG - МОНО Цинк** при одному позакореновому підживленні - 0.5-2 л/га, в залежності від типу культури та етапу вегетації.

Рекомендована кількість підживлень протягом вегетаційного сезону - 1-3 (в залежності від виду і стану культури). Заборонено проводити позакореневе підживлення при сильному вітрі та яскравому сонячному опроміненні!