



ВОЛПЕКС®



МОНО Залізо

Fe - 6.0%

Органічне залізо у водному розчині

швидкозасвоюване залізо на органічних компонентах
стійкий у робочих розчинах, не забиває форсунки оприскувачів
оптимальне рішення з точки зору "ціна/якість" для промислових
с/г культур

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

6,0%

Залізо (Fe) ^{75 г/л}

ОПИС ПРОДУКТУ

Залізо активно бере участь в процесах обміну речовин, активізує дихання рослин, впливає на утворення хлорофілу. Залізо входить до складу ферментів, які беруть участь в окислювально-відновних реакціях. У рослину залізо поступає у вигляді іонів Fe²⁺ і Fe³⁺, а також у незначній кількості у вигляді молекул хелатних сполук, і концентрується (близько 80%) в білку хлоропластів, тобто в листках.

Дефіцит заліза спричиняє затримку росту рослин, молоді листки стають хлоротичними. При гострому дефіциті заліза листя біліє, і лише жилки листка по краях залишаються зеленими. Залізо не переміщається з старого листя в молоде. Часто від нестачі заліза страждають плодові культури, особливо при вирощуванні на карбонатних ґрунтах чи ґрунтах з надлишком вапна - при цьому відбувається так званий вапняний хлороз. Древа з сильним хлорозом погано цвітуть, різко знижується врожай плодів.

INTERMAG - МОНО Залізо - рідке мікродобриво, концентрат заліза на базі органічних комплексоутворюючих агентів, які забезпечують повне і швидке поглинання заліза поверхнею листків та стабільність у робочих розчинах для позакореневого підживлення.

Препарат рекомендується для позакореневого підживлення всіх с/г-культур, схильних до дефіциту заліза.

INTERMAG - МОНО Залізо рекомендується в першу чергу для запобігання хлорозу на плодкових культурах, плодкових кущах, полуниці, винограді та декоративних рослинах. Застосування цього мікродобрива приводить до збільшення кількості хлорофілу, асиміляційної площі листків, інтенсивності фотосинтезу і до підвищення стійкості рослин до стресів.

ДОЗУВАННЯ

Рекомендована витрата **INTERMAG - МОНО Залізо** при одному позакореновому підживленні - 1.0-3.0 л/га, в залежності від типу культури та етапу вегетації.

Рекомендована кількість підживлень протягом вегетаційного сезону - 1-3 (в залежності від виду і стану культури). Заборонено проводити позакореневе підживлення при сильному вітрі та яскравому сонячному опроміненні!