



LUBOPLON® MAG-MAKS

MgO - 20%, SO₃ - 35%

Сульфат магнію гранульований

особливо рекомендується для підживлення озимого ріпаку та озимої пшениці, цукрових буряків, картоплі, кукурудзи та на багаторічних плантаціях

забезпечує магній та сірку, необхідні для високоякісних та якісних культур

зменшує негативний вплив токсичного алюмінію на кореневу систему рослин

підвищує ефективність використання азотних добрив

підвищує стійкість рослин до грибкових хвороб та атак шкідників

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

20%

магній (MgO), в т.ч. розчинний у воді - 15%

35%

сірка в сульфатній формі (SO₃), розчинна у воді

ОПИС ПРОДУКТУ

Рекомендується для передпосівного підживлення для доповнення ґрунту магнієм та сіркою.

Добриво особливо підходить для підживлення озимого ріпаку та озимої пшениці, а також цукрових буряків, картоплі та кукурудзи, а також на багаторічних плантаціях. Призначений для використання на легких і кислих ґрунтах, де відбувається вимивання магнію. На легких ґрунтах рекомендується розділити дозу на 30-50% на початку осені, а решту на початку весни, щоб запобігти вимиванню компонентів. У виснажених / погіршених положеннях рекомендовані дози слід збільшити на 50%.

При вирощуванні озимого ріпаку та озимої пшениці добриво також слід вносити ранньою весною, щоб відновити плантацію після зими та підготувати рослини до ефективного використання першої дози азоту. У багаторічних насадженнях використовуйте близько половини запланованої кількості навесні (перед початком вегетації рослин). Використовуючи пасовища чи луки, використовуйте їх у менших дозах, бажано після випасу худоби або скошування.

ДОЗУВАННЯ

Культури	Дози (кг/га)
Озимий ріпак	250-400*
Ярі та озимі культури	150-300*
Кукурудза на зерно	200-300*
Буряк	200-450*
Картопля	200-500*

*Нижня доза в межах застосовується для вирощування на гною, верхня - без гною.