



ВОЛПЕКС®



## BONTAR MAX

**NPK (CaMgS) 8-8-20 (4-3-32) + B, Mn, Mo**

Універсальне добриво для садівництва

забезпечує правильний ріст рослин, поліпшує якість с/г культур  
(смак, зовнішній вигляд і запах)

підвищує стійкість до посухи, морозу і хвороб

дуже хороші розсіювальні властивості

### ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 8%     | азот (N) в амонійній ( $\text{NH}_4$ – 4%) та амідній ( $\text{NH}_2$ – 4%) формах |
| 8%     | фосфор ( $\text{P}_2\text{O}_5$ ), розчинний в мінеральних кислотах                |
| 20%    | калій ( $\text{K}_2\text{O}$ ), розчинний у воді                                   |
| 4%     | кальцій ( $\text{CaO}$ ), розчинний у воді                                         |
| 3%     | магній ( $\text{MgO}$ )                                                            |
| 32%    | сірка в сульфатній формі ( $\text{SO}_3$ )                                         |
| 0,1%   | бор (B) у формі тетраборату натрію                                                 |
| 0,1%   | марганець (Mn)                                                                     |
| 0,006% | молібден (Mo)                                                                      |

### ОПИС ПРОДУКТУ

**BONTAR MAX** - сучасне гранульоване високотехнологічне багатоскладникове добриво, що містить оптимальний набір макро-, мезо- та мікроелементів для підживлення овочевих і плодових культур.

Різні форми азоту (амонійна та амідна) у складі гранули забезпечують його оптимальне засвоєння рослинами. Безхлорний калій у формі сульфату калію позитивно впливає на якість фруктів та овочів (розмір, зовнішній вигляд, колір, смак, запах), підвищує стійкість с/г культур до посухи, морозів та хвороб.

**BONTAR MAX** - універсальне добриво для садів, призначене для підживлення плодових дерев та чагарників, а також овочів у польових умовах та в теплицях. Добриво можна використовувати для приготування субстрату при вирощуванні овочів та декоративних рослин в теплицях та для пізньої обробки.

### ДОЗУВАННЯ

| Культури                                                                     | Дози (кг/га) |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Молоді фрукти (1-3 роки)                                                     | 350-550      |
| Плодючі сади                                                                 | 400-600      |
| Горох, квасоля, цибуля, огірок, редиска                                      | 500-700      |
| Китайська і качанна капуста, цвітна капуста, помідор, перець, морква, селера | 600-800      |
| Малинові плантації                                                           | 500-700      |
| Плантації смородини та агрусу                                                | 450-650      |
| Суниця                                                                       | 350-550      |