



VOLPEKS®



mocznik.pl N 46

N 46%

Карбамід (сечовина)

легко розчинне у воді, спиртах і аміаку

у вигляді білих рівномірних гранул (зернистість 1-3 мм, не менше 90%), забезпечених антизлежувачами

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

46%

Азот (N) в амідній формі.



ОПИС ПРОДУКТУ

mocznik.pl є дуже універсальним добривом для позакореневого підживлення. Він містить 46% азоту в амідній формі. У ґрунті ця форма в результаті ферментативного гідролізу перетворюється в амонійну, а потім у нітратну. Завдяки цьому процес засвоєння азоту кореневою системою рослини відбувається повільніше та рівномірніше. **mocznik.pl** можна використовувати для всіх культур, а також для позакореневого внесення у водному розчині з концентрацією, адаптованою до потреб виду, що підживлюється, та фази розвитку рослин. Азот із сечовини рівномірно розподіляється по рослинах, тому не відбувається надмірного накопичення шкідливих нітратів як у рослинах, так і в ґрунтових водах. Сечовину не можна змішувати з іншими азотними добривами - виняток становить лише сульфат амонію. Допускається незадовго до посіву, як і у разі змішування з NP, NPK добривами та калійною сіллю.



ДОЗУВАННЯ

Рекомендовані дози добрива mocznik.pl в кг/га			
Рослина	Необхідність внесення азотних добрив		
	Дуже маленький і маленький	середній	Великий і дуже великий
Жито, ячмінь і овес - дозування на кожну тону отримання орієнтовного врожаю зерна	35	40	55
Пшениця і тритикал - дозування на кожну тону отримання передбачуваного врожаю насіння	40	55	65
Ріпак - дозування на кожну тону отримання орієнтовного врожаю насіння	90	110	130
Кукурудза на силос на гною - дозування на кожні 10 тонн отримання передбачуваної зеленої маси	30	35	45
Кукурудза на зерно - дозування на кожну тону отримання передбачуваного врожаю зерна	33	43	50
Горох, боби - дозування на кожну тону отримання передбачуваного врожаю насіння	20	30	40
Картопля на гною - дозування на кожні 10 тонн бульб	65	75	90
Картопля без гною - дозування на кожні 10 тонн бульб	90	100	110
Буряк цукровий без гною - дозування на кожні 10 т коренеплодів	90	100	110
Буряк кормовий на гною - дозування на кожні 10 т коренеплодів	22	33	37
Луки та пасовища - дозування на кожні 2 т сіна або 10 т зеленої маси.	40	45	54
Трави в польовому вирощуванні - на кожні 10 т прийнятої зеленої маси	87	110	125
Трави з бобовими - на кожні 10 т прийнятої зеленої маси	43	55	65