



ВОЛПЕКС®



## LUBOFOSKA® 4-12-12

**NPK (CaS) 4-12-12 (14-29)**

Універсальне гранульоване добриво

ідеальне для передпосівного внесення під озимі культури

дуже висока ефективність на ґрунтах, бідних на кальцій і сірку

дуже хороші розсіювальні властивості

мікродози бору (9 ppm), міді (10 ppm), марганцю (55 ppm) та цинку (70 ppm) покращують засвоєння інших компонентів

### ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

|     |                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|
| 4%  | азот в амонійній формі (NH <sub>4</sub> )                                 |
| 12% | фосфор (P <sub>2</sub> O <sub>5</sub> ), розчинний в мінеральних кислотах |
| 12% | калій (K <sub>2</sub> O), розчинний у воді                                |
| 14% | кальцій (CaO), розчинний у воді                                           |
| 29% | сірка в сульфатній формі (SO <sub>3</sub> ), розчинна у воді              |

### ОПИС ПРОДУКТУ

**LUBOFOSKA® 4-12-12** - універсальне гранульоване основне добриво, призначене для передпосівного застосування під усі озимі сільськогосподарські культури, а також для весняного підживлення ярих зернових і коренеплодів; може використовуватися для вирощування фруктів і овочів, на луках і пасовищах для покращення якості кормів.

Кругла гранула розміром 2-5 мм забезпечує хороші розсіювальні властивості та рівномірність засвоєння.

Найбільша ефективність **LUBOFOSKA® 4-12-12** досягається при змішуванні з ґрунтом на глибину до 10-20 см під час передпосівної обробки ґрунту.

Добриво не містить компонентів, що перешкоджають сходженню насіння, що дозволяє проводити сівбу через 2-4 дні після підживлення. На луках та пасовищах **LUBOFOSKA® 4-12-12** слід застосовувати поверхнево і розсівати ранньою весною, одноразово, відповідно до кількості фосфору, необхідного для всього періоду вегетації.

У садівництві підживлення слід здійснювати після збору врожаю фруктів. В овочівництві висів добрива слід виконувати під час заходів з підготовки поля.

### ДОЗУВАННЯ

| Культури                | В залежності від вмісту фосфору в ґрунті |          |         |
|-------------------------|------------------------------------------|----------|---------|
|                         | низький                                  | середній | високий |
| Зернові озимі           | 300                                      | 200      | 100     |
| Зернові ярі             | 250                                      | 180      | 100     |
| Озимий ріпак            | 400                                      | 300      | 100     |
| Кукурудза               | 300                                      | 200      | 100     |
| Соняшник                | 300                                      | 200      | 100     |
| Картопля                | 350                                      | 250      | 100     |
| Зернові бобові культури | 300                                      | 200      | 100     |