



ВОЛПЕКС®



Vigor S

S - 90%, бентоніт - 10%

Сірка гранульована з бентонітом

забезпечує повноту засвоєння азоту в рослині, покращує перенос азоту з кореневої системи в пагони, листя і плоди

обмежує утворення небілкових форм азоту

підвищує смакові та ароматичні якості рослин

збільшує витривалість с/г культур до хвороб, шкідників, морозу та посухи

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

90%	сірка елементарна
10%	бентоніт (спеціальна гігроскопічна глина)

ОПИС ПРОДУКТУ

Vigor S - сірка гранульована з бентонітом - спеціальне сірчане гранульоване добриво, призначене для поповнення ґрунту сіркою та підживлення сірколюбних рослин. **Vigor S** відрізняється від чистої гранульованої або меленої сірки наявністю у складі гранули спеціальної гігроскопічної глини - **бентоніту**, яка сприяє розкладенню сірки на мікроскопічні гранули, придатні до переробки бактеріями на сульфат.

Vigor S також називають добривом відкладеної дії. Завдяки тому, що мікроорганізми у ґрунті займаються переробкою сірки у сульфатну форму тільки по мірі виносу сульфатів кореневою системою рослин, дане добриво дуже слабо вимивається і його можна вносити у ґрунт про запас. Одноразове внесення 80-100 кг/га **Vigor S** гарантовано забезпечить необхідною кількістю іонів сульфату різні культури на протязі двох сезонів вегетації. Початок доступності сульфату для кореневої системи рослин після внесення в ґрунт за різними оцінками становить 80-100 днів, тому **Vigor S** найкраще застосовувати восени, щоб навесні в період інтенсивного росту та внесення азотних добрив коренева система рослини могла правильно і рівномірно засвоювати азот.

Vigor S рекомендується застосовувати восени разом з основними добривами в процесі передпосівної обробки ґрунту (під озимі зернові, ріпак), а також навесні - під с/г культури з пізніми етапами інтенсивної вегетації (цукровий буряк, кукурудза, соя, ярі зернові, соняшник, плодово-ягідні та овочі).

ДОЗУВАННЯ

Культури	Дози (кг/га)
Капустяні	10-40
Озимий ріпак	20-40
Кукурудза	15-20
Пшениця	15-20
Редиска	35-40
Цукровий буряк	30-35
Морква, цибулеві, ячмінь	10-15
Горох, кукурудза, люцерна, пшениця	15-20
Помідори	10-30
Квасоля	5-10
Фасоля	5-10