



МІКРОХЕЛАТ Zn-15

Zn - 15%

Мікрогранульований EDTA-хелат цинку

стимуляція формування ауксину - правильне зростання і розвиток рослин

підвищення ефективності використання азоту

поліпшення загального стану рослин і збільшення врожайності

інтенсифікація розвитку бутонів (квіткових, листових) у плодкових культурах

збільшення стійкості рослин до періодичного дефіциту води та низьких температур

швидке відновлення рослин після виникнення стресових умов

ВМІСТ ДІЮЧИХ РЕЧОВИН:

15%

Цинк (Zn) 150 г/кг

ОПИС ПРОДУКТУ

МІКРОХЕЛАТ Zn-15 - швидкорозчинне монокомпонентне ультрагранульоване мікродобриво, EDTA-хелат цинку (Zn), призначене для програм фертигації або позакореневої обробки рослин, які мають критичну потребу в цинку.

Цинк, що потрапляє на листову поверхню або до кореневої системи рослин у складі мікродобрива **МІКРОХЕЛАТ Zn-15**:

- ефективно і швидко поглинається рослинами;
- безпечний для рослин у всіх методах застосування (відповідно до рекомендованих доз);
- стабільний в багатокomпонентних розчинах;
- стабільний у широкому діапазоні pH;
- стійкий у ґрунтах у широкому діапазоні pH.

МІКРОХЕЛАТ Zn-15 ідеальний для профілактичного та інтервенційного застосування на с/г-культурах з високими потребами у цинку (кукурудза, пшениця, картопля, фруктові дерева і чагарники, полуниця, цибуля, шпинат). Підживлення рослин цинком необхідне у випадку ґрунтових умов, які обмежують доступність цього хімічного елемента для рослин (високий рівень pH, високий вміст фосфору, відсутність кисню у кореневій зоні).

МІКРОХЕЛАТ Zn-15 використовується в термінах вегетації і дозах, рекомендованих у відповідних програмах обробки с/г-культур, що ефективно запобігає виникненню дефіциту цинку в рослинах.

ДОЗУВАННЯ

Оптимальні кількості робочого розчину: 200-300 л/га - для с/г-культур, 500-1000 л/га - для садівництва, 400-600 л/га - для овочевих плантацій.

УВАГА! При низькій вологості не використовуйте розчин з концентрацією, що перевищує 0.15% (1.5 кг мінеральних добрив на 1000 л води). При використанні листових культур під плівкою концентрація не повинна перевищувати 0.15%.

Обробку препаратом рекомендується виконувати кожні 3-7 днів, поки дефіцит цинку не зменшиться:

- сільськогосподарські культури: 0.25-1 кг/га;
- фруктові дерева, виноград: 0.5-1 кг/га;
- плодві чагарники, полуниця, овочі, декоративні рослини: 0.2-1 кг/га.

МІКРОХЕЛАТ Zn-15 отримав сертифікат IUNG-PIB в місті Пулави для використання в органічному сільському господарстві за номером NE/317/2016.